Angeborene äußere Nasendeformitäten und ihre Behandlung

R.

Meyer

St. Gallen

Es werden Fälle von Fehlbildungen der Nase aus der Praxis gezeigt. Nasenfisteln bleiben unberücksichtigt, da ihre Korrektur keine interessanten Probleme bietet. Von einem sehr seltenen Fall von Proboscis lateralis bei einem Säugling mit Atresie der rechten Nasenseite wird uns das einzig bekannte Korrekturverfahren von Forrest Young gezeigt. Das im Bild gezeigte Kind ist noch nicht ope-riert. Ein Fall von Dysplasie der äußeren und inneren Nase mit starkem Hypertelorismus und einem großen Lipom, das die ganze Nasengegend einnimmt und die Nasenlöcher weit auseinander-drängt, und mit einer wabig-knöchernen Auftreibung der Scheidewand bei Einsenkung der vorderen Schädelgrube im Bereich der Lamina cribrosa konnte nach mehreren Eingriffen zu einem befriedigenden funktionellen und ästhetischen Resultat geführt werden. Ein extremer Fall von Doggenase mit weit auseinanderstehenden Orbitae und starker Wölbung der Nasenknochen sowie der drei-eckigen Knorpel wurde in zwei Sitzungen korrigiert. Bei einem Kind mit Flachnase bei Fehlen der Nasenknochen wurde vorläufig

260 Gesellschaft Schweiz. Hals-, Nasen- und Ohrenärzte

mit alloplastischem Implantat der Nasenrücken gebildet. Von den mannigfaltigen Nasendeformationen bei Lippen- und Gaumenspalten-trägern werden 15 Beispiele von Früh- und Spätkorrekturen gezeigt. In einzelnen Fällen mußte mit einer Abbe-Estlander'schen Lippenplastik Material an das Filtrum gebracht werden.

Erscheint später in extenso in dieser Zeitschrift.

Contribution clinique a la chirurgie des cancers laryngés et hypolaryngés.

1) CH. BESSERO, Martigny.

L'évidement de la chaîne ganglionnaire latéro-cervicale à titre prophylactique est toujours indiqué dans les cas de cancers hypo-pharyngé et laryngé extra-cordal indépendamment de l'extension locale de la lesion tumorale.

Cet évidement lorsque l'état general du patient le permet doit être associé à l'ablation de la néoplasie en un seul temps et en un seul bloc.

L'évidement bilateral doit être également pratiqué à titre prophylactique dans les localisations cancéreuses primaires laryngée et hypopharyngée médianes postérieures.

Le trace péri-tumoral de l'incision opératoire en tissu sain doit être basé non seulement sur les limites macroscopiques de l'extension cancéreuse mais surtout sur la connaissance de l'intensité et des limites de l'infiltration microscopique qui ne sont pas uniformément les mêmes sur tout le porteur de la lesion tumorale visible. Cette predominance directionnelle de l'infiltration microscopique est facile à déterminer lorsque l'on connaît le siege initial laryngé ou hypopharyngé du cancer car elle est soumise à des facteurs régionaux (anatomique, embryologique, distribution du système lymphatique) qui la canalisent.

Paraîtra plus tard in extenso dans cette Revue.