Contribution clinique a la chirurgie des cancers laryngés et hypolaryngés

Ch.		Bessero
-----	--	---------

Martigny

L'évidement de la chaîne ganglionnaire latéro-cervicale à titre prophylactique est toujours indiqué dans les cas de cancers hypo-pharyngé et laryngé extra-cordal indépendamment de l'extension locale de la lésion tumorale.

Cet évidement lorsque l'état général du patient le permet doit être associé à l'ablation de la néoplasie en un seul temps et en un seul bloc.

L'évidement bilatéral doit être également pratiqué à titre prophylactique dans les localisations cancéreuses primaires laryngée et hypopharyngée médianes postérieures.

Le trace péri-tumoral de l'incision opératoire en tissu sain doit être basé non seulement sur les limites macroscopiques de l'extension cancéreuse mais surtout sur la connaissance de l'intensité et des limites de l'infiltration microscopique qui ne sont pas uniformément les mêmes sur tout le porteur de la lésion tumorale visible. Cette prédominance directionnelle de l'infiltration microscopique est facile à déterminer lorsque l'on connaît le siège initial laryngé ou hypopharyngé du cancer car elle est soumise à des facteurs régionaux (anatomique, embryologique, distribution du système lymphatique) qui la canalisent.

Paraîtra plus tard in extenso dans cette Revue.