La transposition du canal de Stenon dans l'ozène et dans la kératite filiforme

S.		Rauch
----	--	-------

Clinique ORL, Genève

Dans des cas sévères de rhinite atrophique où l'on ne peut même plus pratiquer l'opération de Lautenschläger et ses variantes, la transposition du canal de Sténon dans le sinus maxillaire (opération de Wittmaack) produit dans bien des cas une amélioration frappante des symptômes cliniques.

Dans la kératite filamenteuse (kératite sèche), une interven-

Autoreferate

447

tion semblable peut être pratiquée en transposant le canal de Sté-non au cul-de-sac conjonctival (opération de Filatov). Nous avons modifié la technique opératoire en faisant passer le canal de Sté-non par voie rétro-zygomatique, ce qui facilite l'opération et améliore son efficacité.

Paraîtra plus tard in extenso dans cette Revue.

Klinischer Beitrag zur Differentialdiagnose der lateralen Halsschwellungen und -tumoren.

Dr. A. WEDER, Basel.

Die Embryologie und Anatomie der Halsorgane bringen es mit sich

daß kaum eine andere Körperregion eine derartige Vielseitigkeit an pathologisch und klinisch interessanten Veränderungen aufweist wie die seitliche Halsgegend. Zur Illustration dieser diagnostischen Buntheit wird hier eine Reihe verschiedener Fälle von lateralen Halsschwellungen und Tumoren berichtet

welche in den letzten Jahren an der ORL-Abteilung des St.-Clara-Spitals in Basel zur Beobachtung gelangten. Nach einigen differentialdiagnostischen Bemerkungen folgt eine tabellarische Zusammenstellung von 25 Krankengeschichten

jede mit einer andern Diagnose: 1. Fibro-neurinom des Halssympathicus; 2. Struma aberrans nodosa; 3. Malignes Papillom (lat. aberr. maligne Struma); 4. Speichelstein mit chronischer Sialoadenitis; 5. Misch tumor der Parotis; 6. Dünn-wandige Parotiscyste; 7. Sezernierende Epitheliome; 8. Lympho-sarkom; 9. Lymphadenose; 10. Myeloblasten-Leukämie; 11. Lymphogranulomatose Hodgkin; 12. Retothelsarkom; 13. Schmincke-scher Tumor mit Lymphknotenmetastasen; 14. Branchiogenes Car-cinom; 15. Carotisdrüsentumor; 16. Mikulicz'sche Krankheit; 17. Lymphknotenmetastasen bei Tonsillen-Ca.; 18. «Maladie des griffes de chat»; 19. Lymphomata colli tbc; 20. Lipom; 21. Dermoid-cyste; 22. Sarkom; 23. Laryngocele; 24. Branchiogene Cyste; 25. Parotis-Ca. Zu diesen 25 verschiedenen Krankheitsbildern kommen noch hinzu: das Atherom

Myom

Chondrom

Haemangiom

Lymphangiom und Aneurysma
ferner das Lymphoblastom (Brill-Symmer)
die Lymphadenitis Püringer
das Adenom der Epithel-körperchen
das Plasmocytom
die Blastomykose und Aktino-mykose. Insgesamt sind es also weit über 30 verschiedene Dia-