La pression intra-tympanique

S.

Tarab

Clinique ORL, Genève

L'emploi du pneumophone nous a conduit à mesurer la pression intratympanique par la ponction du tympan au moyen d'une aiguille spéciale, reliée à un capillaire contenant une bulle de liquide coloré. La comparaison des indices pneumophoniques avec les résultats fournis par la ponction du tympan sont habituellement concordants dans l'insuffisance tubaire.

Les courbes des modifications de l'audition (en decibels) sous différentes pressions, pour les oreilles normales et dans l'otosclérose, se ressemblent, de même que les courbes dans des cas de per-

454 Gesellschaft Schweiz. Hals-, Nasen- und Ohrenärzte

forations tympanales. Ceci pourrait s'expliquer par des modifications d'impédance de la fenêtre ronde.

Il est théoriquement possible de rétablir la pression barométrique dans la caisse en cas d'insuffisance tubaire chronique, en pratiquant une communication entre la paroi postéro-supérieure du conduit auditif externe et l'antre. Ces expériences sont encore au stade d'essai. Paraîtra plus tard in extenso dans cette Revue.

Discussion.

Rüedi: Ich habe mich sehr für dieses Referat interessiert. Im allgemeinen ist die Behandlung des chronischen Tubenkatarrhs recht schwierig, da häufig allergische Faktoren mit im Spiel sind.

Eine Methode, mit der ich in hartnäckigen Fällen oft Erfolge habe, ist die folgende:

Parazentese und Absaugen des Transsudats.

Wenn dies nicht genügt: Ausgedehnte Parazentese im hintern untern Quadranten (ohne Anästhesie), Auflegen eines Wattebäuschchens vor die Parazenteseöffnung und Aspiration des Transsudats mit dem pneumatischen Trichter in die anliegende Watte. Einlegen eines Bäschchens mit 100/o Cocain vor die Perforation und Einlegen eines etwas zugespitzten ca. 5–6 mm langen Acrylit-Röhrchens in die Perforationsstelle. Dieses kann 6 Monate liegen gelassen werden; kommt es spontan heraus, kann es wieder eingelegt werden. Der Druckausgleich ist gut, und es kommt zu keiner Sekretansammlung mehr.

Natürlich muß ein Tubentumor als Ursache des chron. Tubenverschlusses ausgeschlossen sein.

La Surdi-Mutité en Suisse.

Dr J. P. DE REYNIER, Lausanne.

Autoreferat nicht eingegangen.

Die Bedeutung der pädagogischen Nachbehandlung in der Schwerhörigenhilfe.

Dr. K. TANNER, Ohrenklinik, Basel.

Erfahrungsgemäß ist den meisten Schwerhörigen mit der Anpassung eines Hörapparates erst halb gedient. Die Patienten müssen lernen

mit dem Hörapparat umzugehen. Es ist die Aufgabe der Nachbehandlung dem Patienten über die Anfangsschwierigkeiten

die in jedem Fall auftreten
hinwegzuhelfen. – Hinzu