XII. Der Druck in den Wirbelvenen des Auges

O.

Weiss

Aus dem physiologischen Institut zu Königsberg i. Pr.

Der lebhafte Gedankenaustausch, welcher über den sogenannten „intraokulären Flüssigkeitswechsel“ vor einer Reihe von Jahren stattgefunden hat, vermag die Verschiedenheit der Meinungen nicht auszugleichen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß alle bisher aufgeführten Argumente nicht beweisen, daß ein kontinuierliches Zufließen und ein gleichgroßes Abfließen des Humor aqueus existiert. Freilich gibt es auch keinen absoluten Beweis dafür, daß eine derartige Strömung unmöglich ist.

Die Anhänger des Flüssigkeitswechsels nehmen an, daß der Humor aqueus die vordere Augenkammer durch Filtration in den Schlemmschen Kanal verläßt. Die treibende Kraft für den Abfluß wäre mithin der Druck; also könnte die Filtration nur stattfinden, wenn ein Druckgefälle von der vorderen Augenkammer zum venösen Kanal besteht. Den Druck in der vorderen Augenkammer kann man leicht messen. Wenn es gelingen sollte, auch den Druck in den Augenvenen zu bestimmen, so würde man voll-

x) Ebenda und: Des traits caractéristiques de l'oculistique opératoire en Égypte. Bull. de la Soc. d'Opht. d'Égypte. Année 1907-8.

142 W i ß , Der Druck in den Wirbelvenen des Auges.

kommen sicher beurteilen, ob eine Filtration im angegebenen Sinne möglich ist oder nicht.

Um der Lösung des Problems näherzukommen, habe ich mich mit Messungen des Blutdruckes in den Venen des Bulbus beschäftigt und es ist mir gelungen, für die Venae vorticosae die Aufgabe zu lösen.

Methodik.

Die Versuche sind an jungen Kaninchen ausgeführt worden. Man findet an diesen Tieren leicht die Vena vorticiosa superior. Der Hautschnitt ist an den hinteren zwei Dritteln des Supraorbitalrandes zu legen, das vordere Drittel dagegen der Blutung wegen zu meiden. Nach der Trennung der Haut trägt man den supraorbitalen Knorpelrand ausgiebig ab unter Schonung des vorderen Drittels. Der Bindehautsack bleibt uneröffnet. Man findet leicht den M. rectus sup., unterbindet ihn nahe und fern vom Augapfel und durchtrennt ihn vorsichtig. Dann gelangt man auf die genannte Wirbelvene. Es gelingt in der Regel nach einiger Übung, in diese Vene eine Kanüle einzuführen.

Die Kanüle, deren ich mich bedient habe, besteht aus Iridium. Sie hat einen äußeren Durchmesser von 0,71 mm, eine lichte Weite von etwa 0,3 mm. An dem Ende, welches in die Vene eingeführt wird, ist sie schräg abgeschnitten, am anderen Ende gabelt sie sich. Das eine Gabelende ist beliebig verschließbar, das andere für die Verbindung mit dem Manometer bestimmt. Wenn man die Kanüle in die Vene einbringen will, so durchschneidet man mit einem scharfen Messer die Vene an ihrem Austritt aus der Sklera. Es gelingt dann meistens, die Kanüle in das Venenlumen einzuführen, ohne daß viel Blut ausfließt, wenn man schnell arbeitet.

Die Kanüle ist mit einem Manometer verbunden, dessen manometrische Substanz Bingersche Lösung vom spezifischen Gewicht 1,006 ist. Das Manometer kann jederzeit durch einen Quetschhahn von der Vene abgesperrt werden. Außerdem gestattet ein mit ihm beliebig in Verbindung zu bringender kommunizierender Behälter den Manometerdruck jederzeit auf beliebige Höhe einzustellen. Man kann auch jederzeit bei Öffnung der Gabelung am Ausfließen des Blutes feststellen, ob die Kanüle durch Gerinnsel verstopft oder durchgängig ist. Ein analog eingerichtetes Manometer steht mit einer Leberschen Kanüle in Verbindung, welche in die vordere Kammer eingeführt wird. Man kann auf diese Weise gleichzeitig den Druck in der vorderen Augenkammer und in der Wirbelvene messen.

W e i ß , Der Druck in den Wirbelvenen des Auges. 143

Die lichte Weite der Manometer beträgt 2 mm, so daß Höhenveränderungen von 1 mm einem Flüssigkeitstransport von rund 3 mm³ entspricht. Die Druckmessung geschieht so, daß mittels des kommunizierenden Behälters die Höhe des Manometerstandes solange schnell hintereinander geändert wird, bis das Manometer weder steigt noch sinkt. Dieser Druckwert wird notiert.

Ergebnisse.

Die Versuchsergebnisse lassen sich am leichtesten in Form einer Tabelle übersehen.

In Quecksilber gemessen ergeben sich absolute Werte für den Augendruck zwischen 25,5 und 33,3 mm, für den Venendruck zwischen 33 und 63,3 mm.

Von Interesse ist auch, die Beziehungen kennen zu lernen, zwischen der Höhe des Augendruckes und der des Venendruckes. Hierüber gibt die letzte Reihe der obigen Tabelle Aufschluß.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß in dem System der Wirbelvenen der Druck höher ist als in der Bulbusflüssigkeit. Es besteht also keine Möglichkeit, daß in dieses Venensystem Flüssigkeit aus dem Auge abfließt.

Man wird mir vielleicht einwenden, daß die beschriebenen Druckmessungen zu hohe Werte für den Venendruck ergeben hätten, weil sie mittels einer endständigen Kanüle angestellt worden sind, somit eine Stauung des Venenblutes stattfinden könne. Die zahllosen Anastomosen der Wirbelvenen untereinander machen diesen Einwand hinfällig.

Zunächst enthalte ich mich jeder Schlußfolgerung über den Druck im Schlemmschen Kanal aus diesen Versuchen. Der springende Punkt ist hier festzustellen

ob er in Verbindung mit den Wirbelvenen steht oder nicht. Beides ist behauptet worden. Ich werde demnächst in eigenen Versuchen auch zu dieser Frage Stellung nehmen.