Zu Dr. Pillats Vortrag: Über das Vorkommen von Chorioiditis tbc. bei Lupus erythematodes

R.	Rudolf	Bergmeister
----	--------	-------------

Filial hat in der Sitzung der Wiener ophthalmologischen Gesellschaft am 21. Januar d. J. Mitteilungen gemacht über das häufige Vorkommen von Chorioiditis tuberculosa bei Lupus erythematodes.

Es sei gestattet, bei dieser Gelegenheit an den im Jahre 1929 in der „Wiener med. Wochenschrift“ von mir veröffent-

Saul, Tränenorgane, Lider, Bindehaut. 225

lichten Fall von Miliartuberkulose der Retina bei Lupus erythematodes acutus zu erinnern, der das von Saganuma zum ersten-mal beschriebene Bild bot: die Retina hatte das Aussehen, als ob kleine Wattestückchen darauf verstreut wären. Die Erkrankung, die unter schweren Allgemeinerscheinungen septischen Charakters zum Tode führte, war eine schwere Tuberkulose-septikämie, die sich im Anschluß an eine dreiviertelstündige Bestrahlung mit Höhensonne wegen des Gesichtsexanthems entwickelt hatte.

Der Obduktionsbefund ergab u. a. Miliartuberkel in der Rinde der Niere, Milztumor mit hanfkorngroßen älteren Tuberkeln, verkäsende Tuberkulose der Hilus- und der Bifurkationsdrüsen, frische Lymphadenitis tbc entlang der Bauchaorta; eitrige Bronchitis, beiderseits teils hämorrhagisches, teils eitrig-fibrinöses, pleuritisches Exsudat, Miliartuberkel in der Pleura, alte Spitzenschwielen, Herdpneumonien usw.

Berichte über die ophthalmologische Literatur.

(Aus d. Univ.-Augenklinik Kiel [Direktor: Geh. Med. Rat Prof. Dr. Heine].)

Tränenorgane, Lider, Bindehaut.

Berichtsjahr vom i. MäFZ 1934 bis zum 28. Februar 1935. Von Dr. HUGO SAUL.

I. Tränenapparat.

Zur Histologie der Tränendrüse äußert sich Buchaly (1): Er kommt auf Grund seiner Untersuchungen an 158 von Leichen stammenden Tränendrüsenpaaren zu folgendem Resultat: Nur 30% weisen einen mit der Lehrbuchnorm übereinstimmenden histologischen Befund auf. Die immer doppelseitig vorhandenen Veränderungen bestanden in Fett-durchwachsungen, Atrophie mit Bindegewebsvermehrung, Hyalinisierung, Bindegewebsverfettung und -verkalkung; daneben wurden Fett-wucherungen und Desorganisation des Drüsenaufbaus mit Lockerung und Verfettung der Epithelien und Abschlüfferung der Zellen im Drüsen-lumen gefunden. Bei längerem Intervall zwischen Tod und Herausnahme der Drüsen konnte, im Gegensatz zu der Axenfeldschen Angabe, ein erhöhter Epithelverfettungsgrad nicht beobachtet werden; dagegen wurde er bei der Atrophie der Epithelien gesehen. Außerdem fanden

Zeitschrift für Augenheilkunde. Bd. 86. Heft 4 (Juni 1935). 15