A propos de la dacryo-cysto-rhinostomie

M.

Marc

Amsler

Travail de la Clinique ophtalmologique de l'Université de Lausanne [Dir.: Prof. M. Amsler]

Nous faisons, a la Clinique de Lausanne, une moyenne de 10 dacryo-cysto-rhinostomies plastiques par an. Cette operation fonctionnelle a complètement supplanté, depuis dix ans, l'opération mutilante de l'extirpation du sac lacrymal. Statistique de nos
Bangerter, Beiträge zur Diagnostik und Therapie des Tränens. 51
60 derniers opérés : 34 femmes, 26 hommes ; age : de 9 à 29 ans : 11 malades ; de 30 à 59 ans : 37 malades ; de 60 à 74 ans : 12 malades. Technique : anesthésie parfaite ; éclairage « scialytique » ; grande fenêtre osseuse ; sutures profondes à la soie. Pas d'incisions canaliculaires préalables, ni de sondages répétés ! L'indication de l'opération de Toti-Bourguet-Dupuy-Dutemps est donnée par la dacryo-cystite purulente chronique, même fistulée. Plus le sac est dilaté, plus l'intervention est facile. Les résultats sont excellents dans l'immense majorité des cas. Les très rares échecs sont constatés immédiatement ; les « rechutes » tardives ne sont pas à craindre.

(Aus der Universitäts-Aug < enkl. Bern [Direktor: Prof. Goldmann].)

Beiträge zur Diagnostik und Therapie des Tränens.

Von A. BANGERTER.

Zeigt die negative Fluoresceinprobe, daß es sich um eine Tränenabflußstörung handelt, ist es unsere Aufgabe, Art und Sitz des Hindernisses festzustellen, um eine entsprechende Therapie durchführen zu können. An Hand des nachfolgenden Schemas machen wir einen Vorschlag zur systematischen Untersuchung der Tränenabflußwege und Indikationsstellung für die Therapie.

I. Spülung ohne Verschieben der Kanüle:

1. positiv: Tränenpunkt zeigt: a) abnorme Stellung (eversio): Myrtenblatt, b) abnorme Lage: Punktplastik, c) Stenose: Dehnung, evtl. Punktplastik;

2. negativ: siehe II.

II. Verschieben der Kanüle: 1. unmöglich,

2. möglich,

a) Spülung ++: Canaliculusstenose bzw. Ventil: Elektrokoagulation und Dauersonde; Spülung – : Kanalstenose siehe III.

III. Privilin in den Kanal (nur bei frischen Stenosen) ,