„Extraction en carré“ de la cataracte secondaire

T.A.

Vos

La Haye

Pour la cataracte secondaire, dite irido-capsulo-ïenticulaire, membrane épaisse, dense, opaque à des degrés variables, et d'autres cataractes secondaires, qui ne sont pas accessibles à la dissection simple, j'ai pratiqué la méthode suivante :

Avec deux serpettes, on découpe un carré dans la membrane cataractueuse, les deux bords verticaux par introduction latérale d'une des serpettes, les deux bords horizontaux par introduction inférieure de l'autre.

Puis, par une petite section cornéenne au limbe, à la petite pique de Vogt, on introduit la pince du même auteur – construite pour l'iridectomie composée. On entreouvre la pince et saisit le carré délivré.

Quand il y a trop de masses cristallines, on peut appuyer un pen sur le globe oculaire avec la pincette à fixation, appuyée sur la sclérotique, en même temps que l'on ferme la pince appuyée sur la membrane, afin de saisir la cristalloïde postérieure à travers les masses. Dans les cas où il est impossible de saisir un repli de la capsule cristalline, on peut introduire le crochet de Tyrrell ou le kystitome et arracher le carré. On bien on doit se contenter d'abord d'extraire les masses cristallines enclavées à la curette de Daviel et répéter au besoin l'intervention indiquée plus tard. Les grands avantages de la technique employée sont, qu'on n'a presque pas de perte de l'humeur aqueuse, de sorte que l'on peut travailler tranquillement, répéter ses tentatives, etc. Mais, le plus grand avantage est, selon moi, que l'on ne peut jamais exercer aucune traction sur l'iris, le corps ciliaire ou les ad-

320 Vos, « Extraction en carré » de la cataracte secondaire

références qui peuvent exister entre la cataracte secondaire et la rétine, spécialement dans les « cataractes secondaires inflammatoires ». En outre on n'a pas à redouter une perte notable de vitré.

Zusammenfassung.

Angegeben werden für nicht der Dissection zugängliche derbe oder massive Nachstare viereckige Nachstarausschnitte mittels zwei Sichelmesserchen, nacheinander in zwei senkrecht zueinander verlaufende Richtungen eingeführt, und Extraktion des «Fensters» mittels Vogts, chei' Iridectomia-composita-Apparatur.

Summary.

For secondary cataracts, which are not accessible to simple dissection, the author has indicated quadrangular excision by means of two sickle-knives, introduced successively in two directions perpendicular to each other, and extraction of the "shutter" by Vogfs Iridectomia-composita-apparatus.

Erratum.

The title of my paper in vol. 112

No. 5

of "Ophthalmologica" was written before the paper was finished. When it was finished I had come to conclusions that were not in accordance with that title as I stressed that the neurological symptoms of the patients with starvation-amblyopia were not very important. I made the mistake to send the paper to the publishers of "Ophthalmologica" with the old title and later asked them to leave out the words "cum Poly-neuropathia". This correction however was not made and the paper appeared under the misleading title. It should have been: "Amblyopia caused by Starvation." A. W. Mulock Houwer.