Hautinfarkte bei der Thromboembolie-Prophylaxe

K.

Fries

Aus der Universitäts-Frauenklinik Zürich (Direktor: Prof. Held)

Seit 1952 führen wir sowohl bei Frischoperierten als auch bei Wöchnerinnen routinemäßig eine Prophylaxe mit Cumarinen durch.

Auffallenderweise konnten wir bei über 4000 gynäkologischen Fällen mit Tromexanprophylaxe und Liquemin-Tromexan-Therapie nie einen Cutaninfarkt sehen, während dagegen bei i. G. 6637 vaginal ent-bundenen Frauen mit Marcoumarprophylaxe 9 Hautkomplikationen auftraten. Dies macht 1,4 ‰ aller Prophylaxen aus.

Im Zeitpunkt des Manifestwerdens der Hautkomplikation haben wir die Gerinnungsfaktoren bestimmt. Bei unseren Fällen finden wir in der Mehrzahl keine Korrelation zwischen Hautkomplikation und

120 Fries, Hautinfarkte bei der Thromboembolie-Prophylaxe

entsprechend starker Senkung von Quick- und Prothrombinwerten und des Faktors VII.

Analog den schon zahlreichen in der Literatur beschriebenen Cutan-infarkten, trat die Komplikation zwischen dem 3. und 6. Tag nach Beginn des Marcoumarstoßes auf und manifestierte sich in Haut-partien, die nie einem mechanischen Insult ausgesetzt waren.

Die Symptomatik der Hautveränderung weist eine gleichbleibende Gesetzmäßigkeit auf, indem primär unier starken, lokal-isierten Schmerzen eine an Cyanose erinnernde Blauverfärbung der Haut sich ausbildet. Entweder bleibt es bei einem «flüchtigen Erythem», oder es bildet sich ein «subcutanes Hämatom», oder infolge Nekrose kommt es zum «Hautinfarkt».

Therapeutisch läßt sich außer einer symptomatischen Lokalbehand-lung auch mit Vasodilatoren und gefäßwandabdichtenden Medika-menten kein überzeugender Effekt erzielen. Ein Abbrechen der Pro-phy-laxe erweist sich nach unseren Erfahrungen sowohl hinsichtlich der Heilungstendenz der Nekrose als auch hinsichtlich der Rezidiv-gefahr als unnötig.

(Erschienen in extenso in dieser Zeitschrift, Vol. 148, No. 1, S. 47–54)

Wacek, A. und Jenny, J.: Gynaecologia 148: 120–127 (1959)

Die Zytologie des Oberflächenkarzínomes der Cervix uteri

Von A. WACEK und J. JENNY, Zurich

Angeregt durch ein Symposium der «Acta Cytologica» über das Vorkommen von Spindelzellen im zytologischen Ausstrich, insbeson-dere beim Oberflächenkarzinom, haben wir den Versuch unternom-men, unser Material diesbezüglich nachzukontrollieren. Wir haben uns allerdings nicht auf die Spindelzellen beschränkt, sondern versucht, die Gesamtheit der im Ausstrich vorkommenden normalen und patho-logischen Zellen zu differenzieren und zu erfassen.

Zur Differenzierung unserer Zellen haben wir ein Schema benützt

das in seinen Prinzipien etwa einer Kombination der bereits existie-renden Schemata von Stoll Berger und Schmitt entspricht (Tab. I).