Presentation d'un film de M. R. Musset (Paris): Traitement chirurgical des déchirures obstétricales anciennes du 3^{ème} degré

J.-P.

d'Ernst

Genève

Adresse de l'auteur: Dr J.-P. d'Ernst, 5, passage des Lions, Genève (Suisse)

Les techniques habituellement utilisées pour la refec-tion chirurgi-cale des déchirures obstétricales du 3e degré conduisent encore à un pourcentage d'insuccès assez élevé. L'opération s'adresse en effet à

d'Ernst

327

des tissus cicatriciels, mal vascularisés et tolerant particulièrement mal le materiel de suture laissé à demeure. M. R. Musset, en s'inspi-rant du procédé de Mocquot, à mis au point une technique opératoire originale reposant sur les principes suivants:

1° Eviter toute dissection et tout décollement étendu des tissus.

2° Absence d'hémostase par ligatures ou par électrocoagulation.

3° Pas d'abandon de materiel de suture perdu, tous les fils étant retires dans les suites opératoires.

4° La reconstitution du canal anal se fait au nylon acapillaire, le sphincter anal et les releveurs sont sutures temporairement au crin de Florence.

5° L'intervention n'exige ni colostomie préalable, ni constipation artificielle de la malade.

Ce procédé opératoire prévient les hématomes, la désunion des tissus et l'infection d'une manière constante et donne d'excellents résultats au triple point de vue anatomique, morphologique et fonc-tionnel. L'auteur a eu l'occasion d'opérer 6 malades avec succès selon cette technique. A l'occasion de cette communication, le film de M. R. Musset illustrant cette méthode est présenté.

Aus der Universitäts-Frauenklinik Basel (Prof. Dr. Th. Koller)

Die paroxysmale Tachycardie in utero

Von P. MÜLLER-SCHMID

Tonbandwiedergabe kindlicher Herztöne bei einem Fall von intra-uteriner paroxysmaler Tachycardie.

(Erschien in Geburtshilfe und Frauenheilkunde 19: 401 [1959]).