Ultrastruktur der gittrigen Hornhautdystrophie

P.		Wobmann
S.L.	Lalive	D'Epinay

Universitäts-Augenklinik, Zürich

Sonderdruckbestellungen an: Dr. med. S. Lalive d'Epinay, **Universitäts-Augenklinik**, Kantonsspital, Rämistrasse 100, CH-8006 Zürich (Schweiz)

(Diese Arbeit erscheint in extenso in Graefes Arch. Ophthal.)

Zwei Fälle gittriger Hornhautdystrophie, deren Ultrastruktur noch wenig bekannt ist, werden beschrieben. Sie weisen Besonderheiten auf: Der eine ist klinisch und histopathologisch eindeutig zu klassifizieren, zeigt aber im elektronenmikroskopischen Bild neben den typischen filamentösen Herden aus Amyloid Stromavakuolen, die sonst typischerweise bei der makulären Dystrophie angetroffen werden. Der zweite Fall kann weder klinisch noch histopathologisch eingeordnet werden, erweist sich aber ultrastrukturell als eindeutiger Fall einer gittrigen Dystrophie mit den typischen Merkmalen.

Diskussion

Gnädinger: Herr Wobmann hat gesagt, dass er bei seinen Fällen keine Veränderung der Bowmanschen Membran fand. Mich interessiert aber, ob die Basal-membran verändert war. Eine solche Veränderung würde ich erwarten, erklärte sie doch die vor allem bei der gittrigen Dystrophie häufig zu beobachtenden rezidivierenden Erosionen. Oder waren bei Ihren Fällen klinisch keine Erosionen aufgetreten?

Wobmann (Schlusswort): Herrn Prof. Babel danke ich bestens für den wertvollen Beitrag mit den instruktiven Bildern, insbesondere der makulären und der kristallinen Dystrophie.

(zu Gnädinger): Hornhauterosionen haben wir in unseren Fällen nicht beobachtet. Auch bezüglich der Histopathologie des Epithels und der Bowmanschen Membran bei der gittrigen Hornhautdystrophie gehen die Meinungen auseinander. Hogan und Alvarado haben elektronenmikroskopische Veränderungen dieser Gebiete beschrieben, während Klinthworth solche nicht erwähnt und wir sie auch nicht gefunden haben.