Teste mit Ganglienblocker und Hydrazinophthalazine bei Nephropathie

A.		Hauser
----	--	--------

Aus der Universitäts-Frauenklinik Basel (Dir.: Prof. Th. Koller)

Erscheint in extenso in der Schweiz. medizin.

Wochenschrift 1954.

Zusammenfassung

Bei Nephropathien kann Nepresol allein oder in Kombination mit Pendiomid beim intravenösen Versuch den Blutdruck über mindestens 5 Stunden wesentlich senken.

Die Empfindlichkeit der Patientinnen auf ein blutdrucksenkendes Mittel ist sehr individuell. Sie kann nicht vorausgesagt werden. Wenn man sich für die Verabreichung dieser Mittel entschließt, soll vorher die Wirksamkeit mit dem Test nachgewiesen werden. Ansonst ist die Therapie unzuverlässig, vielleicht sogar gefährlich. Nur Aus-testung ermöglicht eine gezielte Behandlung.

Bei laufender Verabreichung muß in regelmäßigen Abständen die Wirksamkeit nachkontrolliert werden. Es entstehen oft schon nach wenigen Tagen Resistenzen, die eine Weiterführung der Medikation überflüssig oder gefährlich machen.

Pendiomid allein kann bei Nephropathien zu massiven Blutdrucksteigerungen führen. Deshalb ist vor Pendiomid als alleiniges Mittel bei Nephropathien zu warnen.