Fundus flavimaculatus

Résumé

J.		Babel
----	--	-------

Clinique universitaire d'ophtalmologie (Directeur: Prof. J. Babel), Genève

Adresse de l'auteur: Prof. J. Babel, Clinique universitaire d'ophtalmologie, 22, rue A.-Jentzer, CH-1205 Genève (Suisse)

(Ce travail a paru in extenso dans les Arch. d'Opht., Paris 32: 109, 1972)

En 1962, Franceschetti décrivait pour la première fois une nouvelle forme de dystrophie rétinienne, signalée exceptionnellement auparavant dans la littérature sans dénomination précise, qu'il baptisait du nom de fundus flavimaculatus. Il s'agissait tantôt d'une affection découverte fortuitement au cours d'un examen de routine, tantôt les malades venaient consulter pour une diminution de l'acuité visuelle. La caractéristique en était la présence de petites taches jaunâtres, à bords parfois indistincts, arrondies ou pisciformes, localisées, en nombre variable, dans tout le pôle postérieur, souvent aussi dans la macula. Le pronostic en semblait bon et les fonctions visuelles peu perturbées, sauf l'acuité visuelle en cas d'atteinte maculaire. La durée d'observation était trop brève pour qu'on puisse discuter de régression, et le caractère familial ou héréditaire manquait dans toutes les premières observations.

Franceschetti exprimait l'idée que cet aspect était probablement l'expression clinique d'états divers. Il semble que l'on doive actuellement réviser cette opinion, et le considérer comme une maladie bien individualisée de l'épithélium pigmenté, apparaissant dans l'enfance ou la jeunesse, très lentement progressive, ne conduisant pratiquement jamais à la cécité, et apparentée à la dégénérescence maculaire juvénile; elle est familiale et transmise selon le type récessif autosomal. Le diagnostic en est relativement facile, surtout à l'aide de l'angiofluorescence aux stades initiaux, mais régression au cours des années peut modifier le tableau clinique et rendre l'interprétation d'une image ophtalmoscopique difficile, ce qui peut dans une certaine mesure expliquer la confusion qui règne dans la littérature.

Babel

391

Discussion

Remky: Le stade tardif d'une dégénérescence vitelliforme à kystes multiples peut imiter l'image du fundus flavimaculatus (démonstration). Peut-on regarder la dégénérescence vitelliforme à kystes multiples comme la forme macrokystique et dominante, le fundus flavimaculatus comme la forme microkystique et récessive de la même épithéliopathie? Les résultats électrophysiologiques parlaient en faveur d'une telle théorie.

Babel (à Remky): Les deux diagnostics possibles dans ce cas
disque vitelliforme ou fundus flavimaculatus

ne sont pas contradictoires puisque dans ces deux maladies l'origine en est une anomalie de l'épithélium pigmenté.