Zu Wiesneth M, Pannenbecker A: Gesetzliche Vorgaben, Verordnungen und Richtlinien für die Gewinnung und Herstellung von peripheren Blutstammzellen. Transfus Med Hemother 2013;40:369–373

Friedger von Auer

Königswinter, Germany

Vorbemerkung

In der Schlussbemerkung ihrer sehr schönen Übersicht der Rechtslage weisen die Autoren noch einmal darauf hin, «dass die aus peripherem Blut gewonnenen Blutstammzellen und die aus Knochenmark entnommenen hämatopoetischen Stammzellen derzeit rechtlich unterschiedlich geregelt sind, auch wenn sie medizinisch in gleicher Weise eingesetzt werden». Und sie vertreten die Ansicht, dass aus medizinischer Sicht einheitliche rechtliche Anforderungen für hämatopoetische Stammzellen – unabhängig von der Art der Gewinnung aus peripherem Blut, Nabelschnurblut oder Knochenmark – geboten seien. Hierzu ist Folgendes anzumerken:

Ausgangslage

Für die arzneimittelrechtlichen Erlaubnisse bei Blut- und Gewebezubereitungen nach den §§ 13, 20b und 20c des Arzneimittelgesetzes (AMG) [1] kommt es auf die Qualitätssicherung der Gewinnung des Ausgangsmaterials und der Herstellung oder Be- oder Verarbeitung dieser Arzneimittel an. Wie sie medizinisch verwendet oder angewendet werden, spielt hierbei keine Rolle. Die Gewinnung von Stammzellen aus dem peripheren Blut unterscheidet sich erheblich von der Gewinnung aus Knochenmark und aus Nabelschnurblut. Auch die Herstellung der Produkte unterscheidet sich. Genau das ist der Grund, weswegen diese verschiedenen Vorgänge auch rechtlich unterschiedlich geregelt sind.

Stammzellen aus dem peripheren Blut

Die Gewinnung von Stammzellen aus dem peripheren Blut geschieht mittels Stammzellenapherese. Dabei handelt es sich um ein Verfahren zur Separation, also der Herausfilterung, der im Blut enthaltenen Blutstammzellen. Ziel der Apherese ist es, genau diese noch nicht ausdifferenzierten (multipotenten) Zellen aus dem Blutkreislauf zu gewinnen. Wesentlich bei dieser Entnahmemethode ist die Vorbehandlung der spendenden Personen zur Mobilisierung der Blutstammzellen aus dem Knochenmark in das periphere Blut. Dazu wird ein auch im Körper vorkommendes Wachstumshormon, G-CSF, verwendet, das heute als zugelassenes Arzneimittel angewendet wird. Der Gesamtvorgang der Blutstammzellenapherese wird fachlich als komplexer Vorgang betrachtet, so dass der Gesetzgeber hierfür aus gutem Grund schon seit Langem eine Herstellungserlaubnis nach den §§ 13 ff AMG vorsieht, mit einer speziellen Sachkunde nach § 15 Absatz 3 AMG. Konkretisierende Vorschriften enthält die Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung (AMWHV) [2].

Die Vorbehandlung von gesunden spendenden Personen hat der Gesetzgeber wegen der Dosierungsproblematik als einen besonders heiklen Vorgang angesehen. Deshalb sieht das Transfusionsgesetz (TFG) [3] hierfür Sondervorschriften vor, die dem Schutz der spendenden Personen dienen sollen. Es handelt sich um die komplementären Spezialvorschriften des § 9 TFG in Verbindung mit § 8 TFG. Diese Vorschriften sehen unter anderem zwingend das Votum einer Ethikkommission vor. Hinzuweisen ist außerdem auf die Richtlinien zur Transplantation peripherer Blutstammzellen, die 1997 von der Bundesärztekammer (BÄK) und dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) ausgearbeitet worden sind [4].

Blutstammzellen aus dem Knochenmark

Die Gewinnung der Blutstammzellen aus dem Knochenmark erfolgt nach Entnahme des Knochenmarks mittels eines operativen Eingriffs (Absaugen). Das Aspirat wird unter sterilen Bedingungen in einem Medium gehalten, in das zur Antikoagulation 5000 IE Heparin gegeben werden. Dann erfolgt eine Aufarbeitung der Knochenmarksuspension, z.B. die Separation der Knochenmarkbestandteile. Die Entnahme von Knochenmark ist rechtlich eine Gewebeentnahme, die früher ebenso wie die Verarbeitung des Knochenmarks aus guten Gründen einer Herstellungserlaubnis nach den §§ 13 ff AMG bedurfte. Seit dem Gewebegesetz von 2007 [5] gelten für die Gewinnung des Knochenmarks die Erlaubnisvorschriften von § 20b AMG und für die weitere Be- oder Verarbeitung die Erlaubnisvorschriften von § 20c AMG. Dazu sind die konkretisierenden Vorschriften der AMWHV zu beachten.

Auch für die Entnahme von Knochenmark sind Spezialvorschriften vorgesehen. Sie ergeben sich aus dem Transplantationsgesetz (TPG) [6], das auch ethische Sachverhalte z.B. zur Entnahme bei Kindern regelt (§ 8a), und der TPG-Gewebeverordnung [7].

Stammzellen aus dem Nabelschnurblut

Stammzellen aus dem Nabelschnurblut sind im Blut von Neugeborenen zirkulierende hämopoetische Vorläuferzellen, die nach der Geburt und Durchtrennung der Nabelschnur ohne Beeinträchtigung des Neugeborenen aus der Plazenta gewonnen werden können. Die Logistik der Gewinnung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und ihrer Aufarbeitung sowie die Transplantation bei Patienten unterscheiden sich so weit von dem Vorgehen bei der Transplantation von Stamm-

zellen aus peripherem Blut oder Knochenmark, dass sie sowohl rechtlich als auch fachlich unterschiedlich geregelt sind. Zunächst gelten auch für die Gewinnung und Aufarbeitung die Vorschriften über die Herstellungserlaubnis nach den §§ 13 ff AMG und die konkretisierenden Anforderungen nach der AMWHV, wie sie auch für Stammzellen aus dem peripheren Blut vorgesehen sind.

Die Spezialvorschriften im TFG enthalten insofern eine Besonderheit, als nach § 4 Satz 1 Nummer 3 TFG bei der Entnahme von Blut nur dann eine ärztliche Person vor Ort anwesend sein muss, wenn das Blut «von einem Menschen», also durch direkten körperlichen Eingriff entnommen wird. Diese einschränkende Formulierung bedeutet, dass die Gewinnung von Nabelschnurblut, die außerhalb des menschlichen Körpers erfolgt, auch durch eine geschulte Fachkraft, wie z.B. eine Hebamme, vorgenommen werden kann, ohne dass eine ärztliche Person zugegen sein muss. Im Übrigen haben die BÄK und das PEI mit den Richtlinien zur Transplantation von Stammzellen aus Nabelschnurblut von 1999 spezielle Richtlinien gemäß §§ 12 und 18 TFG für diese Stammzellen für erforderlich gehalten [8].

Fazit

Die genannten Arten von Blutstammzellen und ihre unterschiedliche Gewinnung und Verarbeitung zu Blut- oder Gewebezubereitungen haben aus verschiedenen fachlichen Gründen zu einem unterschiedlichen Rechtsinstrumentarium und zu unterschiedlichen fachlichen Regelungen in Richtlinien geführt. Insofern erscheint es als eine besondere Herausforderung, «einheitliche rechtliche Anforderungen für hämatopoetische Stammzellen» zu begründen.

Literatur

- 1 Arzneimittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3813) geändert worden ist.
- 2 Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung vom 3. November 2006 (BGBl. I S. 2523), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 11. Februar 2013 (BGBl. I S. 188) geändert worden ist.
- 3 Transfusionsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2007 (BGBl. I S. 2169), das durch Artikel 12 des Gesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 1990) geändert worden ist.
- 4 Richtlinien zur Transplantation peripherer Blutstammzellen. Erarbeitet vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer unter Mitwirkung des Paul-Ehrlich-Institutes. Dtsch Ärztebl 1997;94: A1584–1592.
- 5 Gewebegesetz vom 20. Juli 2007 (BGBl. I S. 1574).
- 6 Transplantationsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. September 2007 (BGBl. I S. 2206), das zuletzt durch Artikel 5d des Gesetzes vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2423) geändert worden ist.
- 7 TPG-Gewebeverordnung vom 26. März 2008 (BGBl. I S. 512), die durch Artikel 2 der Verordnung vom 11. Februar 2013 (BGBl. I S. 188) geändert worden ist.
- 8 Richtlinien zur Transplantation von Stammzellen aus Nabelschnurblut (CB = Cord Blood). Erarbeitet vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer unter Mitwirkung des Paul-Ehrlich-Institutes. Dtsch Ärztebl 1999;96:A1297–1304.