departments in this country. This is shown on slide 7. These figures again do not include the horse antitoxin distributed from commercial sources.

Studies on a large scale have demonstrated that the gamma-globulin fraction from pooled "normal" plasma is efficacious in the prophylaxis of poliomyelitis. Specific hyperimmune antibodies directed against the appropriate strains might well prove to be a valuable addition to our presently available weapons used against this disease. Such specific hyperimmune globulin might produce passive immunity over a much longer period of time than obtained with the usual pooled "normal" globulin.

Theoretically, the production of hyperimmune antibodies could be directed towards other diseases to which there exists a satisfactory antigenic stimulus. Furthermore, this technic provides the opportunity for exploration of certain theoretical aspects such as the mechanism of antibody production. It makes available large amounts of specific, individual antibody either animal or human, on which studies such as the chemical separation of antibody globulin from normal globulin may be attempted.

Finally, the plasmapheresis technic provides a method for obtaining relatively large amounts of rare or fleeting antibodies; for example following pregnancy it would be possible to obtain several units of plasma from sensitized mothers, whose antibodies are of high titer for a short period.

Etude des nouvelles fractions protéiniques du serum humain normal

J. Lewin

Paris, France

En soumettant à l'électrophorèse sur papier le serum concentré par ultrafiltration, nous avons pu constater qu'il existe d'une façon constante dans le serum humain normal des fractions protéiniques migrant plus vite que l'albumine.

Deux fractions rapides peuvent être décrites:

1° Une fraction Q 1 migrant avec une vitesse peu supérieure à celle de l'albumine et qui paraît assez homogène au point de vue électrophorétique.

2° Une composante Q 2 plus rapide que la précédente, très hétérogène électrophorétiquement et de ce fait s'étalant sur une surface étendue devant l'albumine.

Les deux fractions rapides prennent une triple coloration: celle des protéines (amido-schwarz, bleu de bromophénol, etc.) des lipoprotéines (Soudan-Noir)

et celle à l'acide periodique de Schiff. Cependant, la coloration au Noir au gras se présente d'une façon particulièrement intense témoignant de la prédominance des composantes lipoprotéiniques dans ces fractions rapides.

Ainsi, il existerait dans le serum normal non pas deux composantes lipoprotéiniques α et β distinctes du point de vue électrophorétique comme il est décrit couramment, mais quatre fractions: α, β₁, β₂ et β₃, cette dernière très hétérogène. Ces composantes rapides s'apparentent aux fractions lipoprotéiniques analogues que nous avons décrites dans le liquide céphalo-rachidien.

L'étude du serum de nombreuses espèces animales a montré la constance de ces fractions dans le règne animal (la fraction β₃ semble surtout abondante chez les carnivores). Parmi les espèces étudiées (cheval, bœuf, mouton, porc, chien, lapin, poule, canard, anguille) c'est l'anguille qui semble caractérisée par une abondance particulière des lipoprotéines rapides surtout du type hétérogène.

Il s'agit probablement de dérivés de certaines protéines plasmatiques courantes (surtout de l'α-globuline) formés par fixation d'un nombre variable de radicaux chargés négativement (par exemple radicaux d'acides gras) bloquant les groupements électropositifs libres de la molécule protéinique et de ce fait augmentant leur vitesse de migration électrophorétique dans les conditions courantes. Des dérivés de ce genre peuvent être reproduits in vitro soit par action sur le serum de certains acides aliphatiques, soit par l'action des composés sulfonés à longue chaîne, ou, par des dérivés de l'acide cholique.

Le taux des lipoprotéines rapides semble être augmenté chez la femme enceinte (surtout la composante β₃). Par contre, il paraît diminué chez les cirrhotiques et les myxœdémateux.

Chez le diabétique, en l'absence d'acido-cétose on constate la disparition très fréquente ou l'atténuation extrême de la tache lenticulaire β₁.

Dans une série de plus de 20 comas diabétiques acidotiques traités par insuline on a vu la fraction lipoprotéinique β₃ nette au départ, diminuer au cours du traitement. Chez l'homme normal ce phénomène n'a pu être provoqué mais l'injection de doses analogues d'insuline est impossible à pratiquer sans de graves inconvénients.

Par contre, l'introduction continue de glucose par voie intraveineuse ou l'ingestion d'une dose unique de glucose chez le sujet normal, produit en effet analogue: diminution des lipoprotéines rapides.

Nous pensons qu'il peut s'agir du même phénomène dans les deux cas, l'injection de sucre provoquant une hypersecretion insulinique.

Ainsi les lipoprotéines rapides constitueraient une étape dans le métabolisme lipidique et leur disparition sous l'influence de l'insuline serait en relation avec le fait connu et exprime depuis longtemps que, sous l'influence de l'insuline les «graisses brûleraient au feu des hydrates de carbone».