Vorwort

Jürgen E. Gschwend^a Kurt Miller^b

^aKlinik und Poliklinik für Urologie, Universitätsklinikum rechts der Isar, Technische Universität München, München, Deutschland;

^bKlinik für Urologie, Charité Centrum Chirurgische Medizin CC 8, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland

Das Prostatakarzinom gilt inzwischen als eine der wichtigsten Erkrankungen des männlichen Geschlechts. Die Zahl der Neuerkrankungen liegt bei knapp 60 000 Fällen pro Jahr in Deutschland [1]. Die Prognose in den frühen Stadien ist gut; dennoch steht das Prostatakarzinom bei den tödlich verlaufenden Tumorerkrankungen des Mannes hierzulande an dritter Stelle: Jährlich versterben etwa 13 000 Patienten an seinen Folgen, denn trotz guter Heilungschancen im lokalisierten Stadium ist beim fortgeschrittenen, metastasierten Stadium nach wie vor nur eine palliative Behandlung möglich [1, 2].

Diese konnte allerdings durch Neuzulassungen der letzten Jahre erheblich verbessert werden. Zu ihnen gehört der Androgen-Biosynthese-Inhibitor Abirateronacetat (Zytiga®). Dieser kommt in Kombination mit Prednison/Prednisolon zum Einsatz und ist – neben Enzalutamid – ein allgemein relativ gut verträglicher, moderner antihormoneller Wirkstoff für die Therapie des metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinoms (mCRPC), der das Überleben der Patienten verbessern und darüber hinaus palliative Effekte wie eine Schmerzlinderung oder eine Reduktion der Fatigue erzielen konnte [3, 4].

Das vorliegende Supplementheft fasst das aktuelle Wissen zur mCRPC-Therapie zusammen. Im ersten Beitrag gibt David Pfister [5] einen Überblick über die grundsätzlichen Therapieoptionen und über Resistenzentwicklungen, die unter der modernen antihormonellen Therapie zu einem weiteren Progress führen können. Jürgen E. Gschwend [6] diskutiert im zweiten Beitrag mögliche Kriterien, die die Wahl zwischen Abirateronacetat und Enzalutamid in der Erstlinientherapie des nicht oder mild symptomatischen mCRPC erleichtern könnten.

Gemäß den Ausführungen von Kurt Miller [7] im dritten Beitrag profitieren nicht oder mild symptomatische Patienten, die in der Erstlinientherapie Abirateronacetat erhalten, womöglich besonders, wenn sie zu Beginn noch einen nur mäßig erhöhten PSA-Wert und keine Schmerzen haben. Wie er weiter ausführt, laufen derzeit mehrere Studien, in denen für aktuell zugelassene Wirkstoffe ein früherer Therapiebeginn im Rahmen der Indikation des Prostatakarzinoms untersucht wird.

Christof Bernemann und Kollegen [8] legen im vierten Beitrag die aktuellen Erkenntnisse zur Resistenzentwicklung beim metastasierten Prostatakarzinom dar. Diese werden derzeit intensiv erforscht, um mögliche prädiktive Biomarker für die Therapiesteuerung zu identifizieren. Darüber hinaus berichten die Autoren von völlig neuen Therapieansätzen, die bei anderen Tumorentitäten zum Teil bereits etabliert sind und erstmals auch beim Prostatakarzinom auf eine personalisierte Medizin abzielen könnten.

Im fünften Beitrag gibt Johannes Maria Wolff [9] schließlich Tipps für den Einsatz von Abirateronacetat im Behandlungsalltag. Ein besonderes Augenmerk richtet er auf die Behandlung von Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen oder Risikofaktoren, inklusive Typ-2-Diabetes, die im fortgeschrittenen Alter ja sehr typisch sind.

Wir hoffen, Ihnen auf diese Weise einen umfassenden Einblick in die mCRPC-Therapie im Allgemeinen und in die Erstlinientherapie des nicht oder mild symptomatischen Stadiums mit Abirateronacetat plus Prednison/Prednisolon im Besonderen geben zu können.

Jürgen E. Gschwend

Kurt Miller

Literatur

- 1 Robert Koch-Institut: Bericht zum Krebsgeschehen in Deutschland 2016. Berlin. www.krebsdaten.de/krebsbericht (letzter Abruf: 9.2.2017).
- 2 Robert Koch-Institut (Hrsg) und die Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. (Hrsg): Krebs in Deutschland 2011/2012, ed 10. Berlin, 2015. www.gk-id.de (letzter Abruf: 9.2.2017).
- 3 Ryan CJ, et al.: Lancet Oncol 2015;16:152–160.
- 4 Suttman H, et al.: EMUC-Kongress, 24.–27.11.2016, Mailand, Italien. # P081.
- 5 Pfister D: Oncol Res Treat 2017;40(suppl 2):DOI: 10.1159/000456164.
- 6 Gschwend JE: Oncol Res Treat 2017;40(suppl 2):DOI: 10.1159/000456165.
- 7 Miller K: Oncol Res Treat 2017;40(suppl 2):DOI: 10.1159/000456166.
- 8 Bernemann C, et al.: Oncol Res Treat 2017;40(suppl 2):DOI: 10.1159/000456167.
- 9 Wolff JM: Oncol Res Treat 2017;40(suppl 2):DOI: 10.1159/000456169.