Editorial

H. Mau

Berlin

Milzchirurgie ist heute organerhaltende, im Sinne des Wortes konservative Chirurgie. Für diesen Wandel in der Einstellung zum Organ Milz ist einerseits die Erkenntnis verantwortlich, daß Immunkompetenz und Infektionsabwehr beim wachsenden Organismus wesentlich an die Funktion der Milz gebunden sind. Andererseits haben die verbesserten technischen Möglichkeiten die Tendenz zur Organerhaltung verstärkt.

Die Gründe, die Milz zu erhalten, sind einfach und immer wiederkehrend: Dies betrifft nicht nur Kinder, auch für Erwachsene liegen inzwischen gesicherte Daten vor. Der Weiterentwicklung der chirurgischen Technik und der technischen Hilfsmittel ist es zu verdanken, daß heute vom Operateur keine technischen Kabinettstückchen verlangt werden, wenn er das verletzte Organ Milz erhalten will. Parenchymreparatur kann mit Hilfe von mechanischen und biologischen Hilfsmitteln so gut geschehen, daß das Risiko eines sekundären Organverlustes gegen Null geht.

Bei einigen hämolytischen Anämien steht heute die Milzteilresektion alternativ zur Splenektomie. Sie reduziert hämatologische Ri-

siken, beseitigt die oft erhebliche Raumforderung im Oberbauch und bewirkt gleichzeitig die Erhaltung der Immunkompetenz und der Clearancefunktion der Milz.

Die Forschung muß uns noch Antworten auf die Fragen geben: Was ist die kristische Milzmasse? Wie groß muß der Milzrest sein, um noch die Clearancefunktion und die Immunkompetenz zu wahren? Muß man die Milzteilresektion gegebenenfalls wiederholen? Bei welchen hämolytischen Anämien ist die Milzteilresektion am erfolgversprechendsten?

Die meisten dieser Fragen werden sich nur durch multizentrische Studien beantworten lassen. Die Immunologie muß uns noch die Parameter zur Beurteilung der Immunkompetenz liefern. Wir müssen klinische Daten sammeln, um vergleichbare Reihen bereitzustellen. Das wichtigste aber ist: Organerhaltende Milzchirurgie ist praktiziertes «nihil nocere». Der splenektomierte Patient trägt das vielfach höhere Risiko, am Overwhelming-postsplenectomy-infection-Syndrom zu erkranken und zu sterben.