Dr. Mohamed Mahde Saleh
Universitätsklinikum Bonn, Klinik und
Poliklinik für Neurologie, Bonn, Deutschland

7 Fragen an

Dr. Mohamed Mahde Saleh und PD Dr. Matthias Scheffler

Träger des «Takeda Oncology Forschungspreises» 2021

PD Dr. Matthias Scheffler
Universitätsklinikum Köln, Klinik I für Innere
Medizin, Ärztliche Leitung des Molekularen
Tumorboards, Köln, Deutschland

Forschungsschwerpunkte

Dr. Mohamed Mahde Saleh

- Molekulare Marker im Lungenkarzinom
- Immunologie

PD Dr. Matthias Scheffler

- Personalisierte Lungenkrebstherapie

Akademischer Werdegang

Dr. Mohamed Mahde Saleh

- 2014–2021: Doktorand in der Abteilung Dermatologie/Immunologie, Universitätsklinikum Göttingen
- 2019–2021: Assistenzarzt für Pathologie, Universitätsklinikum Köln
- seit 2021: Assistenzarzt für Neurologie, Universitätsklinikum Bonn

PD Dr. Matthias Scheffler

- 2007: Start als Assistenzarzt in der Klinik I für Innere Medizin der Uniklinik Köln, Lung Cancer Group Cologne (LCGC) im Centrum für Integrierte Onkologie (CIO) Köln Bonn
- 2012: Promotion zum Dr. med. (summa cum laude)
- 2019: Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie
- 2019: ESMO Leader Generation Program
- seit 2019: ESMO Lung Cancer Faculty; ESMO Climate Change Task-Force; Lung Cancer Group
- 2020: Venia legendi (Priv.-Doz.) für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie
- seit 2020: YouTube-Kanal für Patienten und Studenten (<https://www.youtube.com/c/OncoEducation>)
- seit 2021: Ärztliche Leitung des Molekularen Tumorboards (MTB) des CIO Aachen Bonn Köln Düsseldorf

Sie wurden für Ihre gemeinsame Arbeit «Comprehensive Analysis of TP53 and KEAP1 Mutations and Their Impact on Survival on Localized and Advanced Stage Non-Small Cell Lung Cancer» mit dem Takeda Oncology Forschungspreis ausgezeichnet. Wie kam es dazu, dass sie sich mit diesem Thema befassen haben?

Saleh: Das war ein glücklicher Zufall. Matthias arbeitet bereits seit langer Zeit mit molekulargenetischen Fragestellungen zum Lungenkarzinom, ich kam im Jahr 2019 neu dazu. Ich habe meine Forschung initial mit den Fragestellungen nach den Auswirkungen verschiedener TP53-Mutationen auf das Überleben von NSCLC begonnen, Matthias wiederum hatte aus Vorarbeiten bereits Erfahrungen mit KEAP1 sammeln können.

In meiner Literaturrecherche (eines der wichtigsten Dinge in jedem Forschungsvorhaben) ist mir aufgefallen, dass TP53 zwar ausführlich als prognostischer Faktor in NSCLC diskutiert wird, jedoch keine wirklich klinischen Konsequenzen daraus gezogen wurden – dies lag nicht zuletzt daran, dass die Studien teilweise unterschiedliche Methodiken und Subgruppen analysiert haben. Da 50% aller NSCLC-Patienten TP53-Mutationen tragen, dachten wir, es sei wichtig, dieser Frage in einer der größten NSCLC-Kohorten weltweit nochmal nachzugehen.

Bei KEAP1 war dies etwas klarer – man wusste, dass KEAP1-Mutationen durch eine veränderte Radio-/Chemotherapieresistenz einen deutlichen negativ-prognostischen Wert haben. Zudem wusste man, dass es deutliche Schnittstellen in den zellulären Signalwegen zwischen TP53 und KEAP1 gibt – eine strukturelle Analyse beider Faktoren gab es jedoch in ausreichender Größe und Qualität eher nicht.

Scheffler: Uns lag bei dieser Arbeit außerdem eine gewisse Diskrepanz zwischen den operablen Stadien und den fortgeschrittenen Stadien am Herzen. Während für die fortgeschrittenen Stadien die Mutationsanalysen längst Standard sein sollten und zu einer deutlichen Verbesserung der Therapieoptionen und Prognose geführt haben, hatte sich für die operablen Stadien jahrelang am therapeutischen Vorgehen gar nichts verändert. Wir wollten hier zeigen, wie wichtig die molekularen Informationen auch in den «frühen» Stadien sind.

Was genau konnten Sie herausfinden? Würden Sie Ihre Erkenntnisse für unsere Leserinnen und Leser bitte zusammenfassen?

Saleh: Es gibt selten generalisierte Antworten in einem komplexen Leben, das bedeutet: Mutation ist nicht gleich Mutation. Gerade bei TP53 führen manche Mutationen dazu, dass das Protein abgebaut und nicht mehr zur Verfügung steht, andere Mutationen wiederum führen zu einer Überexpression des Proteins. Dieses fehlgefaltete Protein kann nun entweder seiner ursprünglichen Funktion nachgehen, oder aber auch ganz andere Funktionen, teilweise sogar prokarzinogene Effekte haben – das bedeutet: Ein alleiniger Blick auf TP53 mutiert ja/nein ist nicht ausreichend, um eine ausreichende Auflösung der prognostischen Gruppen zu erhalten. Grob lässt sich sagen, dass trunkierende TP53-Mutationen dazu führen, dass das Protein nicht exprimiert wird, während «Missense»-TP53-Mutationen eher zu einer Überexpression führen. Dies ist nun also die erste «Einteilung». Eine weitere Einteilung geschieht eher klinisch, in dem man sagt, manche Karzinome sind lokal, manche sind fortgeschritten – die lokalen erhalten in aller Regel eine operative Therapie, während die fortgeschrittenen eine Kombination aus Chemotherapie und Immuntherapie erhalten. Nun haben wir zuerst die Effekte der unterschiedlichen TP53-Mutationen auf lo-

kale und fortgeschrittene Stadien untersucht – natürlich haben das schon zig Arbeitsgruppen vorher gemacht, jedoch haben diese ganz unterschiedliche Klassifikationen gewählt, und teilweise keine so stringente und einheitliche Datenanalyse durchgeführt, wie sie in unserer Patientenkohorte durchgeführt wurde, weswegen «kleine» Effekte oft übersehen werden.

Nun zeigte sich, dass für lokale Stadien trunkierende TP53-Mutationen mit einer signifikanten negativen Prognose einhergehen, während Missense-Mutationen eine vergleichbare Prognose mit TP53-WT-Patienten haben.

In fortgeschrittenen Stadien hat die Art der TP53-Mutation gar keinen Effekt auf das Überleben.

Für KEAP1 zeigte sich sowohl für lokale als auch für fortgeschrittene Stadien ein negativ-prognostischer Effekt.

Interessant wird es, wenn man sich nun anschaut, was für einen Effekt eine kombinierte Mutation von TP53 und KEAP1 hat: Für fortgeschrittene Stadien konnten wir sehen, dass eine kombinierte Mutation KEAP1-mutiert und TP53-Missense-mutiert einen Überlebensvorteil für die Patienten bringt; das bedeutet, es könnte einen Mechanismus geben, in dem das mutierte TP53-Protein einen negativen Effekt einer anderen Mutation wieder teilweise rückgängig macht – dies ist aber nur spekulativ.

Scheffler: Man würde nicht unbedingt erwarten, dass die Mutationen in den lokalen Fällen solch eine große Rolle spielen können: Der therapeutische Ansatz ist hier ja kurativ, man entfernt den sichtbaren Tumor oder bestrahlt und gibt dazu auch Chemotherapie, um im Optimalfall keine Krebszelle mehr am Leben zu lassen. Bei Auftreten eines Rezidivs erfolgt dann die molekulare Aufarbeitung und eine möglichst passende systemische Therapie. Das ist Usus vor der Annahme, dass die vorherige Therapie unabhängig von den molekularen Markern gleich gut ist – «OP ist OP». Wenn man aber sieht, dass es signifikante Überlebensunterschiede zwischen verschiedenen Subgruppen im lokalen Stadium gibt, muss m.E. bereits in den frühen Stadien «personalisierter» therapiert werden.

Wie lassen sich diese Erkenntnisse in der klinischen Praxis einsetzen/anwenden?

Saleh: In vielerlei Hinsicht sind diese Ergebnisse relevant. Erstens zeigen wir, dass man auch in lokalen Stadien mit dem Wissen über den Mutationsstatus eine prognostische Stratifikation vornehmen kann. Dies könnte bedeuten, dass Patienten von einer anderen Therapie besser profitieren würden – sollte man KEAP1-mutierte Patienten unbedingt bestrahlen, wenn sie eine erhöhte Radioresistenz aufweisen? Vielleicht sollte man das, aber das ist nicht ganz klar. Dies sind Fragen, die man stellen kann, um einen patientenadaptierten und möglichst unschädlichen Therapie anzubieten. Zweitens gibt es verschiedenen Therapieansätze für TP53- und KEAP1-mutierte Tumoren. Unsere Studie unterstreicht, dass nicht jede Mutation gleich ist und gibt Hinweise, welche Patienten von einer gezielten Therapie profitieren könnten. Drittens ist es nun klar, dass man den klinischen Kurs anhand des Wissens des TP53- und KEAP1-Mutationsstatus zwar noch nicht verändern, aber deutlich besser voraussagen kann – so sind Patienten mit gewissen Mutationen eventuell öfter nachzukontrollieren, da man über die schlechtere Prognose nun Bescheid weiß. Diese Schlussfolgerungen sind alle mit Vorsicht zu genießen, da es sich um eine retrospektive Analyse handelt, die

mit den jeweiligen methodischen Limitationen einhergeht – trotzdem denke ich, dass unsere Daten einen Einfluss auf die zukünftigen klinischen Entscheidungen haben sollten.

Scheffler: Bei zielgerichtet therapiebaren Mutationen wie z.B. den EGFR-Mutationen ist man den ersten Schritt in den letzten Jahren schon gegangen und testet im operablen Stadium auf EGFR-Mutation, um dann ggf. unmittelbar nach der Operation eine adjuvante zielgerichtete Therapie zu starten. Das ist hinsichtlich der Senkung eines Rezidiv-Risikos der «klassischen», mutationsagnostischen adjuvanten Chemotherapie dramatisch überlegen (ADAURA-Studie). Unsere Arbeit zeigt auch einige Subgruppen, die prognostisch einfach besser laufen, was hier vor allem auf die sehr guten Systemtherapien zurückzuführen ist. In diesen Fällen wäre der Zeitpunkt eines Therapiestarts eventuell neu zu definieren. Bei TP53- und KEAP1-Mutationen mit Funktionsverlust können wir aktuell nichts spezifisch inhibieren – hier lägen die Ansatzpunkte eher in der Optimierung des perioperativen Settings i.S.v. Operationsausmaß, Intensivierung von Chemotherapie-Schemata, Bestrahlung; und gerade bei Mutationen, die nichts Zielgerichtetes hergeben, sehr reizvoll und gegenwärtig in vielen Studien untersucht (dort aber meist in Unkenntnis der molekularen Marker): perioperativer Einsatz der Immun-Checkpoint-Blockade (PD-1- bzw. PD-L1-gerichtete Antikörper).

Was ist aus Ihrer Erfahrung besonders wichtig, um Forschung und klinische Medizin optimal miteinander zu verbinden?

Saleh: Forschung und klinische Medizin sind zwei eigenständige Disziplinen, mit unterschiedlichen Zielsetzungen, die aber immens voneinander profitieren. Klinische Medizin kümmert sich primär um den Patienten, der Patient als ganzheitliches Konstrukt ist im Fokus der Handlung. Die Forschung wiederum hat einen anderen primären Fokus: sie sucht «Wahrheiten». Der klinisch-wissenschaftlich tätige Arzt steht nun in dem Bereich dazwischen und versucht, die Erkenntnisse der Forschung in klinisch-umsetzbare und im besten Falle patientenzentrierte Empfehlungen umzuwandeln. Diese «Kommunikationsaufgabe» erfordert ein hohes Maß an Flexibilität und Gewissenhaftigkeit, aber ist natürlich sehr reizvoll, weil man so auch etwas von beiden Welten mitkriegt. Als Arzt bekommt man Einblicke in das Leben von Patienten, die man als alleiniger Forscher so nicht erhält, man erhält auch einen Einblick, was das Leben von Patienten direkt verbessern könnte, während wissenschaftliche Fakten oft ohne direkt menschlichen Bezug stehen.

Scheffler: Hierzu wird seit einigen Jahren der Begriff «Translation» verwendet: Erkenntnisse in der Forschung sollen auch in die Klinik «übersetzt» werden («bench-to-bed») und umgekehrt («bed-to-bench»). Hier spielen Pathologie und Onkologie schon so etwas wie eine Vorreiterrolle. Für eine optimale Lungenkrebstherapie müssen beide Seiten eng kooperieren, und auch Ergebnisse aus der Grundlagenforschung finden sehr schnell Einzug in das klinische Setting. Wichtig ist hier m.E. der regelmäßige Austausch und ggf. Nachhaken, wenn da doch jemand die falsche Sprache spricht.

Wenn Sie sich etwas für Ihre weitere Forschung wünschen dürften, was wäre das?

Saleh: Es gibt nichts Wichtigeres in der Wissenschaft, als dass diese unabhängig von Ideologie, Gesinnung und Wertvorstellungen bleibt. Nur

aus der Unabhängigkeit und Unbefangenheit der Wissenschaft kann wirkliche Erkenntnis entstehen. Ich wünsche mir, dass dies so bleibt.

Scheffler: Noch stärkere Kooperationen und öffentliche Zurverfügungstellung wichtiger Daten. Die aktuelle Situation und v.a. die Pandemie im vergangenen Jahr haben gezeigt, wie wertvoll z.B. Preprints sein können. Scores wie der Altmetric-Score zeigen, wie wichtig die breite öffentliche Diskussion von Ergebnissen ist. Ist aber alles auf einem sehr guten Weg!

Womit schaffen Sie für sich selbst und für Ihr Umfeld einen Ausgleich zu Ihrer Arbeit in der Forschung?

Saleh: Definitiv meine Beziehung und mein Sport. Ich bin auch sehr empfindlich, was das angeht. Wenn ich diese beiden Sachen für eine längere Zeit (2–3 Wochen) nicht ausüben kann, werde ich nervös und halte das auch nicht lange aus. Ich denke, wer viel mit dem Kopf arbeitet, braucht einen umso intensiveren Ausgleich, sonst ist man nicht mehr balanciert und die Arbeit leidet auch darunter.

Scheffler: Am meisten natürlich durch die Unterstützung meiner Familie. Forschung ist zeitaufwändig und mit Abstrichen in der Freizeit verbunden, das ist ohne den Support meiner Frau und meines Sohnes nicht denkbar. Darüber hinaus kann ich mich sehr glücklich schätzen, beruflich in einem super Team mit maximaler Unterstützung aller arbeiten zu dürfen.

Sie haben den 1. Preis verliehen bekommen, der mit insgesamt 30 000 Euro dotiert ist. Mögen Sie uns verraten, wie Sie das Preisgeld anlegen werden?

Saleh: Für mich persönlich wird dieses Geld in die Finanzierung meiner nächsten Projekte gehen, heißt aktuellste Software für statistische Analysen, Publikationskosten usw. – all die Dinge, über die man sich keine Gedanken machen sollte, damit man ungestört forschen kann.

Scheffler: Die Digitalisierung ist – glücklicherweise – ja auch schon im Gesundheits- und Wissenschaftsbereich angekommen. Mit Videos oder Streams bietet sich die Möglichkeit, Forschungsergebnisse auch für Menschen ansprechend aufzuarbeiten, die nicht so sehr «drin» sind in der Forschung. Hier würde ich gerne nachlegen.

Ganz herzlichen Dank für das ausführliche Interview und Ihnen beiden weiterhin viel Erfolg, Herr Dr. Saleh und Herr Dr. Scheffler!

ANGABEN ZUM PREIS

Takeda Oncology hat einen gemeinsamen Antrieb: Innovationen fördern. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wird seit 2018 jedes Jahr ein hochkarätiger Forschungspreis ausgelobt. Im vergangenen Jahr waren Wissenschaftler aus Kliniken, klinischen Einrichtungen und Forschungsinstituten dazu aufgerufen, ihre herausragenden Arbeiten und Projekte aus dem Bereich «NSCLC-Onkogene Treibermutationen» einzureichen.

Die eingereichten Arbeiten aus der präklinischen und klinischen Forschung werden durch ein unabhängiges Expertengremium gesichtet und herausragende Projekte ausgezeichnet.

Der mit insgesamt 60 000 EUR dotierte Forschungspreis hat das Ziel, wegweisende Arbeiten zu unterstützen und somit die Entwicklung neuartiger Medikamente für Patienten weiter voranzutreiben.

Homepage: www.takeda-onkologie.de/forschungspreis-nsclc