Vorwort

Nachdem in der Vergangenheit die Ergebnisse der Chemotherapie bei den gastrointestinalen Tumoren für Patienten und Onkologen wenig überzeugend waren, hat die Entwicklung der Chemotherapie in den letzten Jahren erheblich an Dynamik gewonnen. Bei keiner anderen Tumorgruppe gibt es zurzeit so viele Neuentwicklungen und relevante Verbesserungen wie bei den gastrointestinalen Tumoren und insbesondere beim Kolon-/Rektum-, Magen-/Ösophaguskarzinom, aber auch bei den bisher als Chemotherapie-refraktär geltenden Tumoren wie Pankreas- und Gallenwegstumoren. Dies ist das Ergebnis der konsequenten Evaluation neuer Chemotherapieprotokolle in prospektiven, kooperativen Studien, unter Einschluss von intravenösen oder oralen Fluoropyrimidinen in Kombination mit Oxaliplatin oder Gemcitabin, z.T. auch Taxanen und Irinotecan. Auch die Signaltransduktionshemmer haben beim kolorektalen Karzinom zum ersten Mal ihre klinische Relevanz bewiesen mit Cetuximab in der Second-line-Therapie oder Avastin in der First-line-Therapie. Dank der gut geplanten Studien und z.T. weltweiter Kooperation entwickeln sich die Therapiestandards rasant; umso wichtiger ist eine rasche und komprimierte Information und Standortbestimmung, damit die neuen Entwicklungen zügig in die Therapie bei Patienten umgesetzt werden können. In diesem Supplement sind daher die neuesten Daten zur adjuvanten Chemotherapie beim Kolonkarzinom mit der Kombination

FOLFOX4 im Vergleich zum bisherigen Standard FU/FA beschrieben. Durch die Kombinationstherapie mit Oxaliplatin konnte eine hochsignifikante Reduktion des Rezidivrisikos erreicht werden. Außerdem wurden die endgültigen Daten der amerikanischen Studie mit FOLFOX4 im Vergleich mit dem nunmehr veralteten amerikanischen Standard «IFL» dargestellt, sowie auch neue Kombinationsprotokolle, wie z.B. Gemcitabin/Oxaliplatin beim Pankreaskarzinom oder Capecitabin/Oxaliplatin beim Magenkarzinom. Die neusten Kombinationsprotokolle zeigen auch, dass die Form der intravenösen FU-Applikation mittels Pumpen etc. der Vergangenheit angehört und die oralen 5FU-Prodrugs die Lebensqualität der Patienten verbessern helfen.

Aber auch bei einer Reihe von anderen soliden Tumoren gibt es erwähnenswerte Entwicklungen, z.B. die relativ hohe Wirksamkeit von Oxaliplatin in Kombination mit Gemcitabin oder Taxanen bei Patienten mit refraktären Keimzelltumoren. All diese vielen neuen Entwicklungen bedürfen der weiteren Überprüfung und Fortentwicklung in großen kooperativen Studien. Hierfür benötigen wir aktive Studiengruppen mit hohem Patientenaufkommen. Für diese wichtige Aufgabe stehen die verschiedenen Arbeitsgruppen der AIO zur Verfügung. Die Mitarbeit aller beteiligten Kollegen in diesen Arbeitsgruppen ist wichtiger denn je.

H.-J. Schmoll, Halle