Vorwort

Auch der kritische und eher skeptische Beobachter wird feststellen, dass sich die klinische Tumorforschung – basierend auf den mit großer Dynamik voranschreitenden Erkenntnissen der molekularen Tumorbiologie – in einem seit vielen Jahren nicht mehr gekannten Aufschwung befindet: Davon zeugt die Vielfalt der neuen, auf spezifische molekulare Mechanismen der Tumorzellen zielenden Substanzen, die «small molecules», die Antikörper oder Kombinationsprodukte sowie die damit verbundene große Zahl klinischer Explorations- und randomisierter Studien, die in kurzer Zeit neue Erkenntnisse zur Wirksamkeit und zum klinischen Nutzen bringen. Wir erleben jetzt den Beginn der Ernte von intensiver Forschung in der Vergangenheit; zugleich ist auf Grund der technologischen Entwicklungen in Zukunft mit einer noch schnelleren Entwicklung zu rechnen. Wer jedoch geglaubt hatte, neue molekulare Therapeutika würden die klassischen Zytostatika überflüssig machen, hat sich getäuscht. Vielmehr verhelfen die Substanzen, die auf neue Targets zielen, nicht nur dem «targeted treatment» zu neuer Blüte (schon Methotrexat und 5-FU sind klassische «targeted drugs» mit Dihydrofolatreduktase bzw. Thymidilatsynthase als Target), da sie vielfach mit den Zytostatika synergistisch wirken und Resistenzen vermindern. Glücklicherweise ist das Nebenwirkungsspektrum dieser neuen Substanzen ein anderes als das der klassischen Zytostatika, so dass sich der Kombination dieser beiden «Substanzgruppen» große Möglichkeiten eröffnen.

Für die Entwicklung dieser neuen Therapieoptionen und -kombinationen bei den verschiedenen Tumoren ist der Einschluss vieler Patienten in klinische Studien nötig und damit ganz besonders die Aktivität von kooperativen Studiengruppen gefragt. Nur eine Gruppe, die in kurzer Zeit viele Patienten einbinden kann, wird an den neuen Entwicklungen in vollem Maß teilhaben und sie voranbringen. Dies zeigt sich auch in den in diesem Heft zusammengestellten Abstracts: Während ein großer Teil von Studien solche Kombinationen, die vor 1–2 Jahren noch neu waren, erneut oder in abgewandelter Form präsentiert, ohne dass hieraus eine wichtige, Therapiestandard-verändernde Erkenntnis zu gewinnen ist oder für den Patienten ein wesentlicher Nutzen entspringt, untersucht ein Drittel aller präsentierten Studien die Integration von Substanzen mit neuen Targets. Hierzu gehören die Inhibitoren des epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor-Pathways, des Neo-

angiogenese-Pathways, des Insulin like growth factor-Mechanismus, sowie den Inhibitoren weiterer Signaltransduktionswege wie z.B. raf-Kinase. Die Daten sind viel versprechend und lassen auf mögliche therapeutische Fortschritte bei einer ganzen Reihe zentraler Tumorarten hoffen. Dies gilt insbesondere für die kolorektalen und HNO-Tumoren, das Ösophaguskarzinom, eventuell das Magenkarzinom, aber auch für das Mamma- und Ovarialkarzinom.

Oxaliplatin hat sich mittlerweile durchgesetzt als wichtiger Kombinationspartner für diverse First-line- und Salvage-Protokolle bei einer Vielzahl von Tumoren, vom kolorektalen Karzinom über das Magenkarzinom, Pankreaskarzinom, Gallenblasen-/Gallengangskarzinom, Mamma- und Ovarialkarzinom und vielen weiteren Tumoren bis hin zum hochmalignen B-Zell-Lymphom und der Hämoblastose. Wegen seiner verbesserten Verträglichkeit und leichteren Applizierbarkeit gegenüber Cisplatin ist Oxaliplatin immer häufiger Partner in Kombinationstherapien. Noch wichtiger hierfür ist bei einer Vielzahl von Tumorentitäten allerdings die ausgeprägte Synergie zwischen Oxaliplatin und Fluoropyrimidinen und anderen Substanzen, insbesondere den EGF-Inhibitoren. So verwundert es nicht, dass die auf neue molekulare Targets zielenden Substanzen, insbesondere die Kombinationen mit Oxaliplatin-haltigen Protokollen, geprüft werden. Das Beispiel des kolorektalen Karzinoms mit einer Remissionsrate von 81% bei der Kombination von FU/FA, Oxaliplatin plus Cetuximab oder Iressa zeigt, dass der Synergismus zwischen FU und Oxaliplatin durch EGF-Inhibitoren weiter verstärkt werden kann und damit ein großes Entwicklungspotenzial für Kombinationstherapien vorhanden ist.

In einer weiteren, sehr wichtigen Arbeit konnte D. J. Sargent von der Mayo Clinic Rochester zeigen, dass DFS ein valider Endpunkt für die Durchführung adjuvanter Studien beim Kolonkarzinom ist (mittlerweile auch von der U.S. Food and Drug Administration anerkannt). Dadurch können nun neue und effektive Therapiekonzepte den Patienten schneller zur Verfügung gestellt werden.

Die in diesem Heft zusammengestellte Auswahl an Arbeiten gibt einen aktuellen Überblick und ermöglicht eine schnelle Orientierung in diesem sich dynamisch entwickelnden Feld.

H.-J. Schmoll, Halle